

**Devant chacun des symptômes, indiquez le chiffre correspondant à la fréquence :**

**Inscrire un score en face de chaque question :**

**1. Jamais, 2. Occasionnellement (1 ou 2 fois/mois), 3. Parfois (1 à 2 fois/semaine), 4. souvent (3 à 5 fois par semaine), 5. tous les jours.**

**Questions auxquelles doivent répondre les PARENTS**

**SCORE**

L'enfant sursaute ou bouge des parties du corps quand il s'endort.	
L'enfant a des scènes agitées de rêve éveillé lors de l'endormissement.	
L'enfant bouge beaucoup les jambes quand il dort ou change souvent de position pendant la nuit ou donne un coup de pied aux couvertures du lit.	
Vous avez observé que votre enfant est somnambule	
Votre enfant a des cauchemars (terreurs) dont il ne se souvient pas le lendemain matin	
Il a de grosses difficultés à se réveiller le matin	
L'enfant se sent incapable de se déplacer, se sent très fatigué, en se réveillant le matin	
L'enfant est somnolent dans la journée (s'endort facilement en voiture, calme, ...)	
L'enfant salive beaucoup la nuit ou il existe des traces de bave sur l'oreiller le matin	
L'enfant se plaint d'avoir mal à la tête le matin	
L'enfant respire la bouche ouverte en dormant	
L'enfant fait encore pipi ou se lève souvent la nuit pour aller aux toilettes	
L'enfant a du mal à se souvenir des leçons apprises la veille au soir (alors qu'il les savait le soir)	
L'enfant a tendance à être un peu endormi par moment à l'école	
L'enfant a une position anormale de la tête en dormant (tête basculée en arrière et en extension)	

**Questions auxquelles doit répondre l'ENFANT**

**Dimension musculaire**

Te sens-tu fatigué même si tu n'as pas fait d'effort physique ou intellectuel ?	
C'est difficile pour toi de rester sans rien faire ?	
Tu as mal à la tête le soir en sortant de l'école ?	
Tu as des douleurs qui se répètent dans le bas ou le haut du dos ?	
Cela t'arrive d'avoir mal aux jambes ?	
C'est difficile pour toi de fixer un texte (ou une personne) de près ?	
Il t'arrive de voir double de près à la fatigue, après avoir lu un texte ?	
Tu es vite essoufflé quand tu fais un effort (par exemple dès que tu cours) ?	
Tu vois flou de près, après avoir lu quelques lignes (avec tes lunettes, si tu en as) ?	

**Dimension spatiale**

C'est difficile pour toi de marcher sur quelque chose d'étroit (une poutre par exemple) ?	
C'est difficile pour toi d'attraper un objet du premier coup- une balle par exemple ?	
Tu tombes facilement, tu te tords facilement les chevilles ?	
Tu te mords facilement la langue ou les joues en mangeant	
Tu te cognes dans des obstacles simples (chambranles de porte par exemple, ...) comme si tu ne percevais pas bien l'espace autour de toi?	

**Dimension perceptive**

Tu as l'impression de lire sans comprendre ce que tu lis ?	
Tu as du mal à te concentrer longtemps ?	
Quand on te parle, tu as l'impression de ne pas bien comprendre ce que tu entends?	
Quand tu lis, tu as l'impression ne pas bien voir : tu sautes des mots, tu rates des retours à la ligne, ..?	
C'est difficile pour toi d'exprimer une idée en parlant et tu as du mal à bien construire tes phrases?	

**SCORE TOTAL (entre 34 et 170) – inscrire la somme des scores des 34 questions**

--

<b>Questions complémentaires pour les PARENTS (importantes pour ajuster le traitement)</b>	
<b>Donnez un score de 1 à 5.</b>	
<i>L'enfant grince des dents pendant le sommeil</i>	
<i>Il se réveille pendant la nuit en sueurs</i>	
<i>Vous l'entendez ronfler bruyamment</i>	
<hr/>	
<i>Douleurs au niveau des talons lors de la marche (maladie de Sever)</i>	
<i>Douleurs abdominales inexplicables</i>	
<i>Mains froides et moites et/ou a toujours froid aux pieds</i>	
<i>Position anormale de la tête pour lire</i>	
<hr/>	
<i>Envie de vomir en voiture (ce que l'on appelle, le mal des transports)</i>	
<i>Retard pour apprendre à faire du vélo.</i>	
<hr/>	
<i>Se plaint d'une grande difficulté pour se concentrer dans le bruit</i>	
<b>Mettre une croix si le signe est présent.</b>	
<i>Votre enfant porte (ou a porté) un appareil d'orthodontie (appareil fixe, gouttière, ...)</i>	
<i>On vous a dit qu'il avait une déglutition anormale</i>	
<i>Est-ce qu'un bilan de troubles attentionnel a été réalisé chez votre enfant?</i>	
<i>A-t-il eu le diagnostic de troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité?</i>	
<i>A-t-il pris, à un moment de sa vie, des médicaments pour améliorer son attention (Ritaline, Quasym, Medikinet, Concerta)?</i>	

Note : ce questionnaire ne permet pas de donner de diagnostic. Il a été établi à partir de la comparaison des signes de dysfonction proprioceptive chez 109 enfants dyslexiques et 134 enfants normo lecteurs. Il est utile pour le thérapeute. D'autres signes de dysfonction proprioceptive peuvent exister.

<p>N'hésitez pas à signaler des signes qui vous paraîtraient anormaux, ou vous inquiètent, et ne figurent pas dans ce questionnaire :</p>
---